

ORYZOSTAR BISPYRIBAC Sodium 10% (w/v) SC SYSTEMIC HERBICIDE

Bispyribac Sodium 10% (w/v) SC is a post emergence broad spectrum herbicide effective against grasses, sedges and broad leaf weeds of rice crop.
RECOMMENDATION FOR USE:

Crop	Weed Name	Dosage/acre Hectare	Formula in Hectare (g)	Waiting period between spray and harvest (in days)
Rice (Nursery)	Echinochloa crusgalli, Echinochloa colomum, Cyperus rotundus, Cyperus diflorus, Cyperus iria, Fimbristylis miliacea, Eclipta alba, Ludwigia, Monochoria vaginalis, Arianthera phaeoxeroides, Sparganium angustifolium	20-25	200-250	300
Rice Trans (planted)		20-25	200-250	300
Rice (Direct seeded)		20-25	250	Waiting period has redundant as period between spray and harvest has been > 78 days

TIME OF APPLICATION: Nursery / Transplanted rice: The optimum time for application is 10-12 days after sowing for Nursery and 10-14 days after planting for transplanted rice when most of the weeds have already emerged and are of 3-4 leaf stage depending upon soil and climatic factors.
Direct seeded rice: For direct seeded rice optimum time of application is 15-25 days after sowing.
PLANT PROTECTION EQUIPMENT: High volume sprayer viz. Knapsack sprayer fitted with flat fan/ flood jet nozzle is recommended.

DIRECTIONS FOR USE: Shake the bottle before use. Measure out requisite quantity of the herbicide and mix it well with small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation.

Application method:- Prior to herbicide application the field should be drained. Field should not be re-flooded within one day of application and water should be maintained continuously. Clear the drains and spraying.
Spraying Instruction: Spray uniformly in the direction of wind. Ensure thorough coverage of the weeds.

PRECAUTIONS:
1. Keep away from food and feedstuff.
2. Avoid contact with skin and eyes.
3. Avoid inhalation of the spray mist.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.

SYMPTOMS OF POISONING: Weakness, vomiting, salivation and diarrhoea.
FIRST AID:
1. If swallowed, induce vomiting by flogging the back of throat. Do not induce vomiting, if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amounts of soap and water.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of water for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled, move the patient to fresh air and provide artificial respiration and give artificial respiration. Get medical attention immediately.

ANTIDOTE: No specific antidote, treat symptomatically.

DISPOSAL OF USED CONTAINER:
1. The package should be broken and buried away from habitation.
2. The used packages should not be left outside to prevent their reuse.
3. The package or surplus material and washing should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
DANGEROUS TO RE-USE EMPTY CONTAINERS

STORAGE CONDITIONS:
1. The package containing herbicide shall be stored in a separate room or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quality and nature of the herbicide.
2. The room or premises meant for storing herbicide should be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination by vapour.

CHEMICAL COMPOSITION: Contents : Bispyribac sodium a.i. 10.00% w/v, Adjuvants 1) Polyoxyethylene polyoxy propylene synthetic alcohol ether : 53.20% w/v, 2) Polyalkylene oxide derivative of a synthetic alcohol : 31.90% w/v, Propylene glycol : 2.00% w/v, Silicon KS-506 : 1.00% w/v, Aluminium oxide : 1.50% w/v, Stabilizer : 1.00% w/v, Water : Q.S. Total 100.00% w/v.
(* Bispyribac sodium a.i.10.00% w/v+5% w/v)

ओराइजोस्टार बिस्प्राइबिक सोडियम १०% (मा/आ) एस सी सिस्टीमिक हर्बिसाइड

बिस्प्राइबिक सोडियम १०% (मा/आ) एस सी सिस्टीमिक हर्बिसाइड
उपयोग:

फसल	खरपतवारों के नाम	मात्रा प्रति हेक्टेयर सॉल्यूशन (ग्राम/ली.)	पानी की मात्रा (ली.)	प्रतिभा अवधि बिस्प्राइबिक व फसल के बीच का अंतराल (दिनों में)
धान (मसी)	सांवा, जंगली घान, गमरुआ, कपरी वाला मोवा, फिकिरिदसिलर, धाना धान्ना, मानवनी, मोनोलेरीया, अल्टरनेरिया, रसाव	२०-२००	३००	-
धान (मसी)	जंगली घान, गमरुआ, कपरी वाला मोवा, फिकिरिदसिलर,	२०-२५	२५०	प्रतीभा अवधि आवश्यक नहीं है, व्यक्तिगत अनुभव के साथ के बीच की अवधि
धान (मसी बिनाई)	सांवा, मानवनी, अल्टरनेरिया, रसाव	२५	२५०	३००

डिजिटार का समय :नीचा/गोला घान के लिए: उचित समय है अक्टूबर-नवंबर जल के परभाव अतः नसरी घान के लिए १० से १२ दिनों के पश्चात एवं सैलत घान के लिए १० से १४ दिन रोमाई के पश्चात ३ से ४ घंटी की अवस्था में मिश्री एवं वातावरणीय परस्थितियों के अनुसार डिजिटार का समय।

सीधी बिनाई के लिए : डिजिटार का उचित समय दुआई के १५ से २५ दिन पश्चात है।

डिजिटार रंग: हाई वॉल्यूम स्प्रेयर जैसे नैसरेक स्प्रेयर जित्त पर फ्लोट फैन या फ्लोट जेट नोजल से ही रंग का घान डालें।

उपयोग के लिए निर्देश : बरफनामा से पहले रोतल को अच्छी तरह छिटाईए : उपचार की वांछित मात्रा को थोड़े से पानी के साथ घोल लें। इसके बाद घाल घोल रंग पानी में डालकर मिलायें।

उपयोग विधि: खरपतवारों के उपयोग से पहले बाँहट कर से पानी निकाल दें। उपचार के एक दिन बाद कर को पानी पानी से भर दें १० दिन तक पानी को उपचारित कर दें बनायें।

डिजिटार के निर्देश: रंग के रंग व बहाव के साथ डिजिटार करें।

डिजिटार समान रंग के साथ करें।

साधानियाँ : १. घाना समीप और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. लवा तथा आंखों के समपर्क से बचायें। ३. डिजिटार के बाद छाछी द्वारा अन्दर जाने से बचायें। ४. डिजिटार के बाद दूधित काड़ा और शरीर के आंगों को अच्छी तरह धोयें। ५. डिजिटार के दौरान धुम्रपान, खाना न समायुक्त इत्यादि का सेवन न करें।

विष के लक्षण : कान्कोरी, डकरी, डूँठ से लार आना व अतिसार।
प्रभावित फसलें : १. यदि निम्न जाने तो लगे के पीछे पट्टुली करके ऊपर की ओर। यदि मीनक बेहोश हो जाय तो पानी न करावें। २. यदि कण्डे और लवा दूधित हो जाए तो कण्डे ऊपर दें और दूधित लवा को पर्याप्त मात्रा में साबुन और पानी से धोयें। ३. यदि अँधेरी दूधित हो जाये तो उनको कपरी मात्रा में साफ पानी से लगाना १० से १५ मिनट तक धोयें। ४. यदि सैलत घान अन्दर पानी हो तो रंगी को छुड़ हटा दें नें जाए। चिकित्सक से संपर्क करें।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बों को उपयोग के बाद तोड़ कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें। २. उपयोग के बाद खाली डिब्बों को दूसरा उपयोग में न लायें अतः बाहर खुला न छोड़ें। ३. बची हुई खरपतवारों, साधानों के घोलन का योग्य रीति से निपटारा करवायें जिससे भले का पानी तथा वातावरण दूधित होने का डर न पड़े।

खाली डिब्बों का दुबारा इस्तेमाल करना खतरनाक है।

भंडारण : १. खरपतवारनाशक के डिब्बों को अलग कमरे अथवा जगह में, साफ पदार्थ जैसे वाले कमरे अथवा जगह से अलग अलगमें नें लाला वाने के अन्दर रखना चाहिए। २. जित्त कमरे अथवा जगह पर खरपतवारनाशक का भंडारण करना हो, वह अच्छी तरह बन्द हुआ, सूखा, हवादार तथा प्रक्रमरूपतः व काली लवा पीछा होने चाहिए जिससे खरपतवारनाशक की भाप एवं वातावरण दूधित नहीं पड़े।

खाली डिब्बों का दुबारा इस्तेमाल करना खतरनाक है।

रासायनिक संघटन : घटक : बिस्प्राइबिक सोडियम स.त. १०.००% w/v, एडजुवन्ट्स १) पोलिआक्रिलोनिन पोलिआक्रिली प्रोपिलिन सिमोलेट एक्कोलेज रंग : ५३.२०% मा/आ, २) पोलिक्लेथिलेन पॉलीप्रोपिलेन सिंथेटिक एल्कोहल एथर : 53.20% w/v, 2) Polyalkylene oxide derivative of a synthetic alcohol : 31.90% w/v, Propylene glycol : 2.00% w/v, Silicon KS-506 : 1.00% w/v, Aluminium oxide : 1.50% w/v, Stabilizer : 1.00% w/v, Water : Q.S. Total 100.00% w/v.
(* Bispyribac sodium a.i.10.00% w/v+5% w/v)

ओराइजोस्टार बिस्प्रायबिक सोडियम १०% (डब्ल्यू/वी) एस सी सिस्टीमिक हर्बिसाइड

बिस्प्रायबिक सोडियम १०% (डब्ल्यू/वी) एस सी है एक उच्च मात्राका आहे ये घायापाय विनाशिल पदार्थ, सेसेस व संद पानाने का निरोध करता है। इसका प्रयोग खरपतार अपने बाद किया जाता है।

बीजक	लगाये जाने वाले	डोज/हेक्टर सा.त. कोर्यु- (मिली.)	पापलत (मिली.)	प्रतीभा अवधि (दिवर)	कालीया कालीया कालीया कालीया दस्ययान अंतराल (दिवराल)
धान	सावा, जाली नारा, इमनीम, सासरर डिमिनिर, उडीवाल मोवा, फिकिरिदसिलर, एल्टरनेरिया अथवा लुसुमिया पायिलेरीया, कोमोलेरीया, अल्टरनेरिया फिकिरिदसिलर, सेनोपिलिया जालेरीया	२०	२००	३००	-
धान (सावा)	सावा, जाली नारा, इमनीम, उडीवाल मोवा, फिकिरिदसिलर, एल्टरनेरिया अथवा लुसुमिया पायिलेरीया, कोमोलेरीया, अल्टरनेरिया फिकिरिदसिलर, सेनोपिलिया जालेरीया	२०	२००-२५०	३००	प्रतीभा कालीया आसन्न नदी आसन्न नदी व कालीया कालीया कालीया कालीया > ७८ दिवस
धान (सीट पेरी)	सावा, जाली नारा, इमनीम, सासरर डिमिनिर, उडीवाल मोवा, फिकिरिदसिलर, एल्टरनेरिया अथवा लुसुमिया पायिलेरीया, कोमोलेरीया, अल्टरनेरिया फिकिरिदसिलर, सेनोपिलिया जालेरीया	२०	२००-२५०	३००	प्रतीभा कालीया आसन्न नदी आसन्न नदी व कालीया कालीया कालीया कालीया > ७८ दिवस

कालीया का समय :नीचा/गोला घान के लिए: उचित समय है अक्टूबर-नवंबर जल के परभाव अतः नसरी घान के लिए 10 से 12 दिनों के पश्चात एवं सैलत घान के लिए १० से १४ दिन रोमाई के पश्चात ३ से ४ घंटी की अवस्था में मिश्री एवं वातावरणी परस्थितियों के अनुसार डिजिटार का समय।

सीधी बिनाई के लिए : डिजिटार का उचित समय दुआई के १५ से २५ दिन पश्चात है।

डिजिटार रंग: हाई वॉल्यूम स्प्रेयर जैसे नैसरेक स्प्रेयर जित्त पर फ्लोट फैन या फ्लोट जेट नोजल से ही रंग का घान डालें।

उपयोग के लिए निर्देश : बरफनामा से पहले रोतल को अच्छी तरह छिटाईए : उपचार की वांछित मात्रा को थोड़े से पानी के साथ घोल लें। इसके बाद घाल घोल रंग पानी में डालकर मिलायें।

उपयोग विधि: खरपतवारों के उपयोग से पहले बाँहट कर से पानी निकाल दें। उपचार के एक दिन बाद कर को पानी पानी से भर दें १० दिन तक पानी को उपचारित कर दें बनायें।

डिजिटार के निर्देश: रंग के रंग व बहाव के साथ डिजिटार करें।

डिजिटार समान रंग के साथ करें।

साधानियाँ : १. घाना समीप और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. लवा तथा आंखों के समपर्क से बचायें। ३. डिजिटार के बाद छाछी द्वारा अन्दर जाने से बचायें। ४. डिजिटार के बाद दूधित काड़ा और शरीर के आंगों को अच्छी तरह धोयें। ५. डिजिटार के दौरान धुम्रपान, खाना न समायुक्त इत्यादि का सेवन न करें।

विष के लक्षण : कान्कोरी, डकरी, डूँठ से लार आना व अतिसार।
प्रभावित फसलें : १. यदि निम्न जाने तो लगे के पीछे पट्टुली करके ऊपर की ओर। यदि मीनक बेहोश हो जाय तो पानी न करावें। २. यदि कण्डे और लवा दूधित हो जाए तो कण्डे ऊपर दें और दूधित लवा को पर्याप्त मात्रा में साबुन और पानी से धोयें। ३. यदि अँधेरी दूधित हो जाये तो उनको कपरी मात्रा में साफ पानी से लगाना १० से १५ मिनट तक धोयें। ४. यदि सैलत घान अन्दर पानी हो तो रंगी को छुड़ हटा दें नें जाए। चिकित्सक से संपर्क करें।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बों को उपयोग के बाद तोड़ कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें। २. उपयोग के बाद खाली डिब्बों को दूसरा उपयोग में न लायें अतः बाहर खुला न छोड़ें। ३. बची हुई खरपतवारों, साधानों के घोलन का योग्य रीति से निपटारा करवायें जिससे भले का पानी तथा वातावरण दूधित होने का डर न पड़े।

खाली डिब्बों का दुबारा इस्तेमाल करना खतरनाक है।

भंडारण : १. खरपतवारनाशक के डिब्बों को अलग कमरे अथवा जगह में, साफ पदार्थ जैसे वाले कमरे अथवा जगह से अलग अलगमें नें लाला वाने के अन्दर रखना चाहिए। २. जित्त कमरे अथवा जगह पर खरपतवारनाशक का भंडारण करना हो, वह अच्छी तरह बन्द हुआ, सूखा, हवादार तथा प्रक्रमरूपतः व काली लवा पीछा होने चाहिए जिससे खरपतवारनाशक की भाप एवं वातावरण दूधित नहीं पड़े।

खाली डिब्बों का दुबारा इस्तेमाल करना खतरनाक है।

रासायनिक संघटन : घटक : बिस्प्राइबिक सोडियम स.त. १०.००% w/v, एडजुवन्ट्स १) पोलिआक्रिलोनिन पोलिआक्रिली प्रोपिलिन सिमोलेट एक्कोलेज रंग : ५३.२०% मा/आ, २) पोलिक्लेथिलेन पॉलीप्रोपिलेन सिंथेटिक एल्कोहल एथर : 53.20% w/v, 2) Polyalkylene oxide derivative of a synthetic alcohol : 31.90% w/v, Propylene glycol : 2.00% w/v, Silicon KS-506 : 1.00% w/v, Aluminium oxide : 1.50% w/v, Stabilizer : 1.00% w/v, Water : Q.S. Total 100.00% w/v.
(* Bispyribac sodium a.i.10.00% w/v+5% w/v)

ओराइजोस्टार बिस्प्रायबिक सोडियम १०% (डब्ल्यू/वी) एस. सी. सिस्टीमिक हर्बिसाइड

बिस्प्रायबिक सोडियम १०% (डब्ल्यू/वी) एस.सी. सिस्टीमिक हर्बिसाइड
उपयोग:

बीजक	लगाये जाने वाले	डोज/हेक्टर सा.त. कोर्यु- (मिली.)	पापलत (मिली.)	प्रतीभा अवधि (दिवर)	कालीया कालीया कालीया कालीया दस्ययान अंतराल (दिवराल)
धान	सावा, जाली नारा, इमनीम, सासरर डिमिनिर, उडीवाल मोवा, फिकिरिदसिलर, एल्टरनेरिया अथवा लुसुमिया पायिलेरीया, कोमोलेरीया, अल्टरनेरिया फिकिरिदसिलर, सेनोपिलिया जालेरीया	२०	२००	३००	-
धान (सावा)	सावा, जाली नारा, इमनीम, उडीवाल मोवा, फिकिरिदसिलर, एल्टरनेरिया अथवा लुसुमिया पायिलेरीया, कोमोलेरीया, अल्टरनेरिया फिकिरिदसिलर, सेनोपिलिया जालेरीया	२०	२००-२५०	३००	प्रतीभा कालीया आसन्न नदी आसन्न नदी व कालीया कालीया कालीया कालीया > ७८ दिवस
धान (सीट पेरी)	सावा, जाली नारा, इमनीम, सासरर डिमिनिर, उडीवाल मोवा, फिकिरिदसिलर, एल्टरनेरिया अथवा लुसुमिया पायिलेरीया, कोमोलेरीया, अल्टरनेरिया फिकिरिदसिलर, सेनोपिलिया जालेरीया	२०	२००-२५०	३००	प्रतीभा कालीया आसन्न नदी आसन्न नदी व कालीया कालीया कालीया कालीया > ७८ दिवस

कालीया का समय :नीचा/गोला घान के लिए: उचित समय है अक्टूबर-नवंबर जल के परभाव अतः नसरी घान के लिए 10 से 12 दिनों के पश्चात एवं सैलत घान के लिए १० से १४ दिन रोमाई के पश्चात ३ से ४ घंटी की अवस्था में मिश्री एवं वातावरणी परस्थितियों के अनुसार डिजिटार का समय।

सीधी बिनाई के लिए : डिजिटार का उचित समय दुआई के १५ से २५ दिन पश्चात है।

डिजिटार रंग: हाई वॉल्यूम स्प्रेयर जैसे नैसरेक स्प्रेयर जित्त पर फ्लोट फैन या फ्लोट जेट नोजल से ही रंग का घान डालें।

उपयोग के लिए निर्देश : बरफनामा से पहले रोतल को अच्छी तरह छिटाईए : उपचार की वांछित मात्रा को थोड़े से पानी के साथ घोल लें। इसके बाद घाल घोल रंग पानी में डालकर मिलायें।

उपयोग विधि: खरपतवारों के उपयोग से पहले बाँहट कर से पानी निकाल दें। उपचार के एक दिन बाद कर को पानी पानी से भर दें १० दिन तक पानी को उपचारित कर दें बनायें।

डिजिटार के निर्देश: रंग के रंग व बहाव के साथ डिजिटार करें।

डिजिटार समान रंग के साथ करें।

साधानियाँ : १. घाना समीप और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. लवा तथा आंखों के समपर्क से बचायें। ३. डिजिटार के बाद छाछी द्वारा अन्दर जाने से बचायें। ४. डिजिटार के बाद दूधित काड़ा और शरीर के आंगों को अच्छी तरह धोयें। ५. डिजिटार के दौरान धुम्रपान, खाना न समायुक्त इत्यादि का सेवन न करें।

विष के लक्षण : कान्कोरी, डकरी, डूँठ से लार आना व अतिसार।
प्रभावित फसलें : १. यदि निम्न जाने तो लगे के पीछे पट्टुली करके ऊपर की ओर। यदि मीनक बेहोश हो जाय तो पानी न करावें। २. यदि कण्डे और लवा दूधित हो जाए तो कण्डे ऊपर दें और दूधित लवा को पर्याप्त मात्रा में साबुन और पानी से धोयें। ३. यदि अँधेरी दूधित हो जाये तो उनको कपरी मात्रा में साफ पानी से लगाना १० से १५ मिनट तक धोयें। ४. यदि सैलत घान अन्दर पानी हो तो रंगी को छुड़ हटा दें नें जाए। चिकित्सक से संपर्क करें।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बों को उपयोग के बाद तोड़ कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें। २. उपयोग के बाद खाली डिब्बों को दूसरा उपयोग में न लायें अतः बाहर खुला न छोड़ें। ३. बची हुई खरपतवारों, साधानों के घोलन का योग्य रीति से निपटारा करवायें जिससे भले का पानी तथा वातावरण दूधित होने का डर न पड़े।

खाली डिब्बों का दुबारा इस्तेमाल करना खतरनाक है।

भंडारण : १. खरपतवारनाशक के डिब्बों को अलग कमरे अथवा जगह में, साफ पदार्थ जैसे वाले कमरे अथवा जगह से अलग अलगमें नें लाला वाने के अन्दर रखना चाहिए। २. जित्त कमरे अथवा जगह पर खरपतवारनाशक का भंडारण करना हो, वह अच्छी तरह बन्द हुआ, सूखा, हवादार तथा प्रक्रमरूपतः व काली लवा पीछा होने चाहिए जिससे खरपतवारनाशक की भाप एवं वातावरण दूधित नहीं पड़े।

खाली डिब्बों का दुबारा इस्तेमाल करना खतरनाक है।

रासायनिक संघटन : घटक : बिस्प्राइबिक सोडियम स.त. १०.००% w/v, एडजुवन्ट्स १) पोलिआक्रिलोनिन पोलिआक्रिली प्रोपिलिन सिमोलेट एक्कोलेज रंग : ५३.२०% मा/आ, २) पोलिक्लेथिलेन पॉलीप्रोपिलेन सिंथेटिक एल्कोहल एथर : 53.20% w/v, 2) Polyalkylene oxide derivative of a synthetic alcohol : 31.90% w/v, Propylene glycol : 2.00% w/v, Silicon KS-506 : 1.00% w/v, Aluminium oxide : 1.50% w/v, Stabilizer : 1.00% w/v, Water : Q.S. Total 100.00% w/v.
(* Bispyribac sodium a.i.10.00% w/v+5% w/v)

रासायनिक संघटन : घटक : बिस्प्राइबिक सोडियम स.त. १०.००% w/v, एडजुवन्ट्स १) पोलिआक्रिलोनिन पोलिआक्रिली प्रोपिलिन सिमोलेट एक्कोलेज रंग : ५३.२०% मा/आ, २) पोलिक्लेथिलेन पॉलीप्रोपिलेन सिंथेटिक एल्कोहल एथर : 53.20% w/v, 2) Polyalkylene oxide derivative of a synthetic alcohol : 31.90% w/v, Propylene glycol : 2.00% w/v, Silicon KS-506 : 1.00% w/v, Aluminium oxide : 1.50% w/v, Stabilizer : 1.00% w/v, Water : Q.S. Total 100.00% w/v.
(* Bispyribac sodium a.i.10.00% w/v+5% w/v)

रासायनिक संघटन : घटक : बिस्प्राइबिक सोडियम स.त. १०.००% w/v, एडजुवन्ट्स १) पोलिआक्रिलोनिन पोलिआक्रिली प्रोपिलिन सिमोलेट एक्कोलेज रंग : ५३.२०% मा/आ, २) पोलिक्लेथिलेन पॉलीप्रोपिलेन सिंथेटिक एल्कोहल एथर : 53.20% w/v, 2) Polyalkylene oxide derivative of a synthetic alcohol : 31.90% w/v, Propylene glycol : 2.00% w/v, Silicon KS-506 : 1.00% w/v, Aluminium oxide : 1.50% w/v, Stabilizer : 1.00% w/v, Water : Q.S. Total 100.00% w/v.
(* Bispyribac sodium a.i.10.00% w/v+5% w/v)

रासायनिक संघटन : घटक : बिस्प्राइबिक सोडियम स.त. १०.००% w/v, एडजुवन्ट्स १) पोलिआक्रिलोनिन पोलिआक्रिली प्रोपिलिन सिमोलेट एक्कोलेज रंग : ५३.२०% मा/आ, २) पोलिक्लेथिलेन पॉलीप्रोपिलेन सिंथेटिक एल्कोहल एथर : 53.20% w/v, 2) Polyalkylene oxide derivative of a synthetic alcohol : 31.90% w/v, Propylene glycol : 2.00% w/v, Silicon KS-506 : 1.00% w/v, Aluminium oxide : 1.50% w/v, Stabilizer : 1.00% w/v, Water : Q.S. Total 100.00% w/v.
(* Bispyribac sodium a.i.10.00% w/v+5% w/v)

ఒరాయిజోస్టార్ బిస్ప్రైబిక్ సోడియం 10% (w/v) SC

బిస్ప్రైబిక్ సోడియం 10% (డబ్ల్యు/వీ) ఎస్.సి. సిస్టెమిక్ హెర్బిసైడ్

బిస్ప్రైబిక్ సోడియం 10% (డబ్ల్యు/వీ) ఎస్.సి. సిస్టెమిక్ హెర్బిసైడ్
ఉపయోగం:

ఫసల్	బీజింగ్లలో లాగే	మాత్రా టెట్ హెక్టార్ స.త. కోర్యు- (మి.లీ.)	పాపలత (మి.లీ.)	ప్రతిభా అవధి (దినాల్)	కాలియా కాలియా కాలియా కాలియా దస్యయాన అంతరాల (దినాల్)
ధాన్	సావా, జానీ నారా, ఇమనీమ, సాసరర డిమినీర, ఉడివాల మోవా, ఫికిరీదసీలర, అల్టరనీరీయా అథవా లుసుమీయా పాయీలరీయా, కుమలెరీయా, అల్టరనీరీయా ఫికిరీదసీలర, సెనోపిలీయా జాలరీయా	20	200	300	-
ధాన్ (సావా)	సావా, జానీ నారా, ఇమనీమ, ఉడివాల మోవా, ఫికిరీదసీలర, అల్టరనీరీయా అథవా లుసుమీయా పాయీలరీయా, కుమలెరీయా, అల్టరనీరీయా ఫికిరీదసీలర, సెనోపిలీయా జాలరీయా	20	200-250	300	ప్రతిభా కాలియా ఆసన్న నదీ ఆసన్న నదీ వ కాలియా కాలియా కాలియా కాలియా > 78 దినాల్
ధాన్ (సీట్ పరీ)	సావా, జానీ నారా, ఇమనీమ, సాసరర డిమినీర, ఉడివాల మోవా, ఫికిరీదసీలర, అల్టరనీరీయా అథవా లుసుమీయా పాయీలరీయా, కుమలెరీయా, అల్టరనీరీయా ఫికిరీదసీలర, సెనోపిలీయా జాలరీయా	20	200-250	300	ప్రతిభా కాలియా ఆసన్న నదీ ఆసన్న నదీ వ కాలియా కాలియా కాలియా